

Invenția se referă la biotehnologie și fiziologie experimentală, și anume la procedee de hrănire a animalelor cu sânge cald, în particular șobolani, pentru sporirea masei corporale.

În prezent, preparatele furajere obținute prin sinteză microbiologică sunt utilizate pe scară largă în creșterea animalelor. Compoziția acestor preparate include vitamine, aminoacizi, enzime, fracțiuni lipidice, macro și microelemente și pot fi folosite ca medicamente sau suplimente alimentare, deoarece posedă proprietăți antioxidante, antibacteriene, antistres, antiinflamatorii (Шептицкий В.А., Братухина А.А., Бурцева С.А. Условно-рефлекторная деятельность белых крыс при длительном потреблении биопрепаратов на основе метаболитов *Streptomyces massasporeus*. Buletinul AȘM. Științele vieții, 2007, nr. 2(302), p. 7-12; Школьников Е.Э. ș.a. Экобиотехнологические препараты для агропромышленного комплекса России. Вестник КТУ, 2014, v. 17, nr. 13, p. 255-263).

Există multe preparate microbiene pe baza streptomicetelor, care în procesul de sinteză a substanțelor antibacteriene formează un număr mare de alți metaboliți diverși după structura chimică, ce se disting prin activitate biologică ridicată și capacitatea de a corecta o serie de funcții fiziologice afectate (Бурцева С.А. Биологически активные вещества стрептомицетов (биосинтез, свойства, перспективы применения). Автореф. диссерт., Chișinău, 2002, 35 p.; Manciu A. Variația indicilor masei corporale și ai microflorei intestinale la pui sub acțiunea biomasei de streptomicete. Lucrări șt. UASM, 2014, v. 40, p. 215-218; Leirós M., ș.a. The *Streptomyces* metabolite anhydroexfoliamycin ameliorates hallmarks of Alzheimer's disease in vitro and in vivo. Neuroscience, 2015, v. 305, p. 26-35; Hong K. ș.a. Actinomycetes for marine drug discovery isolated from mangrove soils and plants in China. Mar. Drugs, 2009, nr. 7, p. 24-44, URL: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19370169/>>).

Se știe că acidul 4-aminobenzoic, precum și derivații săi, sunt stimulatori de creștere pentru multe microorganisme obligatorii, care locuiesc în intestinalele animalelor, capabile să sintetizeze vitamine, astfel participând la procesele metabolice și menținerea echilibrului microflorei intestinale (Babin N.A. The influence of vitamin para-aminobenzoic acid on the productivity and morphological blood composition of rabbits in summer period of year. ВестникКрасГАУ. 2018, nr. 6, p. 325-330; Зобова Н.С., Шилов А.В. Эффективность использования парааминобензойной кислоты в рационах кормления молодняка крупного рогатого скота. Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, ВАК, 2013, p. 101-104).

Ca soluție proximă s-a utilizat procedeul de hrănire a șobolanilor Wistar pentru creșterea greutatei corporale prin suplimentarea rației alimentare cu biomasa tulpinii *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06, obținută în urma cultivării pe un mediu cu următoarea compoziție (g/L): făină de porumb 20,0; făină de soia 10,0; glucoză 10,0; NaCl 5,0; K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 3,0; CaCO<sub>3</sub> 1,0; apă restul, în rezultatul căreia creșterea săptămânală în greutate corporală a șobolanilor de la a 5-a până la a 10-a săptămână a depășit martorul cu 125,69-158,71% [1]. Dezavantajul acestei metode constă în creșterea săptămânală insuficientă a greutatei corporale a șobolanilor.

Problema tehnică pe care o rezolvă prezenta invenție constă în sporirea creșterii greutatei corporale săptămânale a animalelor cu sânge cald experimentale.

Problema se rezolvă prin procedeul de hrănire a animalelor cu sânge cald, care include suplimentarea rației alimentare cu biomasa tulpinii *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06, obținută prin cultivarea pe un mediu nutritiv, ce conține, g/L: făină de porumb 20,0; făină de soia 10,0; glucoză 10,0; NaCl 5,0; CaCO<sub>3</sub> 1,0; acid 4-aminobenzoic 1,37, apă restul, în cantitate de 250 mg/kg de masă corporală pe zi, timp de 10 săptămâni, care contribuie la sporirea creșterii săptămânale în greutate a șobolanilor, începând de la a 5-a până la a 10-a săptămână a experienței.

Rezultatul tehnic constă în sporirea săptămânală a greutatei corporale a masculilor de șobolani cu 4,54-488,14% și a femelelor cu 52,71-108,86%, din săptămâna a 5-a până în săptămâna a 10-a de hrănire.

Exemplu de realizare a invenției

Tulpina *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06 se cultivă pe mediul cu următoarea componentă (g/L): făină de porumb 20,0; făină de soia 10,0; glucoză 10,0; NaCl 5,0; CaCO<sub>3</sub> 1,0, apă restul (mediul BM); Mediul BM 1 – BM + 1,37 g/L acid 4-aminobenzoic; mediul BM 2 – BM + 2,74 g/L acid 4-aminobenzoic. Cultivarea are loc în baloane Erlenmeyer (V 1000 ml) cu 200 ml de mediu (pH 7,0-7,2), pe agitator la temperatura de 27°C, timp de 5 zile. Biomasa obținută se separă de lichidul cultural prin centrifugare (5000 rot/min). Se usucă până la greutatea stabilă la 40-45°C. După măcinare, biomasa este gata pentru utilizare în scopuri experimentale.

Testarea a fost efectuată pe 30 de șobolani de laborator albi Wistar (18 masculi, 12 femele). Începând de la vârsta de 8,5 săptămâni, animalele au fost hrănite cu rație specială timp de 10 săptămâni. Animalele au fost împărțite în următoarele grupe: 3 loturi de masculi, câte 6 șobolani în fiecare grup – grupa 1 (BM), dietă standard cu adaos de biomasă a tulpinii *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06 (250 mg/kg de masă corporală pe zi); grupa 2 (BM 1) - dietă standard cu adaos de biomasă a tulpinii *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06, cultivată pe un mediu nutritiv, care conține 1,37 g/L de acid 4-aminobenzoic, grupa 3 (BM 2) - dietă standard cu adaos de biomasă a tulpinii *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06, cultivată pe un mediu nutritiv, care conține 2,74 g/L de acid 4-aminobenzoic; 2 loturi de femele, 6 șobolani în fiecare grup – grupa 1 (BM) - dietă standard cu adaos de biomasă a tulpinii *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06, grupa 2 (BM 1) - dietă standard cu adaos de biomasă a tulpinii *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06, cultivată pe un mediu nutritiv, care conține 1,37 g/L de acid 4-aminobenzoic. Rezultatele obținute, prezentate în tabelul 1, au arătat că adăugarea biomasei tulpinii *Streptomyces massasporeus* CNMN-Ac-06 la hrana animalelor din loturile experimentale conduce la o majorare a greutatei corporale absolute săptămânal. Totodată, s-a constatat că efectul maxim în raport cu creșterea în greutate se observă

la animalele din lotul experimental BM 1, utilizând biomasa tulpinii studiate cultivate pe un mediu nutritiv, care conține acid 4-aminobenzoic în concentrație de 1,37 g/L. După cum se poate observa din datele prezentate, creșterea săptămânală în greutate corporală a șobolanilor din grupul experimental BM 1, în săptămânile 6-10 ale experimentului este semnificativ mai mare decât indicatorii grupului BM și indicatorii grupului experimental BM 2 (Tabelul 1).

Tabelul 1

Dinamica creșterii săptămânale în greutate a șobolanilor albi Wistar

Grupuri de animale			BM	BM 1	BM 2	
Creștere medie absolută în greutate	Durata experienței (săptămâni)	1	g	25,42±3,80	21,91±2,16	25,13±3,18
			%	100,0	86,19	98,85
		2	g	22,30±2,71	27,20±2,98*	18,30±1,94
			%	100,0	121,97	82,6
		3	g	17,11±1,38	20,90±1,64	16,21±1,40
			%	100,0	122,15	94,73
		4	g	10,03±1,20	12,91±1,36	17,19±1,45*
			%	100,0	128,71	171,38
		5	g	11,21±1,01*	11,72±1,10*	11,47±1,06*
			%	100,0	104,54	102,31
		6	g	12,42±1,13*	21,53±2,62*	6,68±1,19
			%	100,0	173,34	53,68
		7	g	6,21±0,98	16,80±1,08*	6,50±1,62
			%	100,0	270,73	104,66
		8	g	9,90±1,18*	12,22±1,93*	6,31±1,04*
			%	100,0	123,43	63,73
		9	g	3,84±0,61	17,64±1,58*	10,21±1,71*
			%	100,0	459,37	265,88
		10	g	3,12±0,21	18,35±1,72*	7,90±1,03*
			%	100,0	588,14	253,2

\* - diferențe semnificative (P<0,05).

Deoarece în experimentele pe șobolani masculi dieta standard cu adăugarea de biomasă a tulpinii *Streptomyces massaporeus* CNMN-Ac-06, cultivată pe mediul nutritiv, care conține 1,37 g/L de acid 4-aminobenzoic (BM 1), a demonstrat cea mai mare eficiență, această doză de acid 4-aminobenzoic a fost folosită la studierea creșterii în greutate a femelelor de șobolani Wistar.

O analiză a datelor privind creșterea în greutate corporală la femelele de șobolani albi Wistar (Tabelul 2) a arătat că în lotul de animale BM 1, care au consumat rația alimentară suplimentată cu biomasa tulpinii *Streptomyces massaporeus* CNMN-Ac-06, cultivată pe mediul nutritiv, care conține 1,37 g/L de acid 4-aminobenzoic, greutatea corporală după două săptămâni de experiment a fost semnificativ mai mare decât cel al grupului BM. Majorări deosebit de semnificative ale creșterii în greutate corporală sub influența biomasei tulpinii *Streptomyces massaporeus* CNMN-Ac-06, cultivate pe mediul nutritiv, care conține 1,37 g/L de acid 4-aminobenzoic (mediul BM 1), au fost înregistrate la 5 săptămâni de la începerea experimentului cu 52,71% până la 108,86% în a 10-a săptămână mai mult decât la animalele din lotul BM (Tabelul 2).

Tabelul 2

Dinamica creșterii săptămânale în greutate a șobolanilor albi Wistar femele

Grupuri de animale			BM	BM 1	
Creștere medie absolută în greutate	Durata experienței (săptămâni)	1	g	22,10±3,12	21,92±2,98
			%	100,0	99,18
		2	g	18,23±2,08	25,40±2,14*
			%	100,0	139,33
		3	g	12,87±1,96*	14,54±1,86*
			%	100,0	112,97
		4	g	9,08±1,51	12,01±1,07*
			%	100,0	132,26
		5	g	10,30±1,35*	15,73±1,41*
			%	100,0	152,71
		6	g	7,25±1,78	13,08±1,26*
			%	100,0	180,41
		7	g	6,26±1,14	11,75±1,17*
			%	100,0	187,69
		8	g	6,91±1,36*	10,91±1,08*
			%	100,0	157,88

	9	g	5,42±1,16	12,10±1,10*
		%	100,0	223,24
	10	g	5,19±1,58*	10,84±1,31*
		%	100,0	208,86

\* - diferențe semnificative ( $P < 0,05$ ).

Alimentarea șobolanilor albi (atât masculi, cât și femele) cu o dietă standard suplimentată cu biomasa tulpinii *Streptomyces massaporeus* CNMN-Ac-06, cultivată pe mediu nutritiv BM suplimentat cu 1,37 g/L de acid 4-aminobenzoic, contribuie la o creștere semnificativă a greutateii corporale a animalelor experimentale, în special de la a 5-a până la a 10-a săptămână de hrănire.