

Metodă de tratament al hiperchineziilor la copii, care constă în aceea că pacientului i se administrează *per os* preparatele *Lymphomyosot*, *Berberis-Homaccord*, *Gelsemium-Homaccord* câte 5...10 picături de 3 ori pe zi în decurs de 1...2 luni și sublingual *Nervoheel* câte 1 pastilă de 3 ori pe zi timp de 1...3 luni, *Spascupreel* și *Spigelon* câte 1 pastilă de 3 ori pe zi timp de 1...2 luni, începând cu a doua săptămână de tratament se introduc subcutanat preparatele *Cerebrum compositum N* câte 2,2 ml, *Traumeel S* câte 2,2 ml, *Placenta compositum* câte 2,2 ml, *Coenzyme compositum* câte 2,2 ml, *Ubichinon compositum* câte 2,2 ml de 1...2 ori pe săptămână în regiunea punctelor biologic active E 36, 40, 44; G 11, 14, 18; MC 6; RP 6, 9; C 5, 7; V 1, 6, 10, 11, 15, 60, 62, 63, 64; VB 1, 16, 20, 41; T 2, 3, 16, 17, 21, 22; IG 3; TR 23; P 3, 7 timp de 5 săptămâni, totodată în fiecare punct biologic activ se introduce un singur preparat medicamentos menționat, iar fiecare preparat se introduce în 3...5 puncte.