

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии, педиатрии, рефлексотерапии и может быть использовано для лечения детей с гиперкинезами.

Метод, согласно изобретению, заключается в том, что пациенту вводят *per os* препараты *Лимфомиозот*, *Берберис-Гомаккорд*, *Гельземиум-Гомаккорд* по 5...10 капель 3 раза в день, в течение 1...2 месяцев и сублингвально *Нервохель* по 1 таблетке 3 раза в день 1...3 месяца, *Спаскупрель* и *Спигелон* по 1 таблетке 3 раза в день 1...2 месяца. Начиная со второй недели лечения, вводят подкожно препараты *Церебрум композитум Н* по 2,2 мл, *Траумель С* по 2,2 мл, *Плацента композитум* по 2,2 мл, *Коензим композитум* по 2,2 мл, *Убихинон композитум* по 2,2 мл, 1...2 раза в неделю в область биологически активных точек Е 36, 40, 44; G 11, 14, 18; МС 6; РР 6, 9; С 5, 7; V 1, 6, 10, 11, 15, 60, 62, 63, 64; VВ 1, 16, 20, 41; Т 2, 3, 16, 17, 21, 22; IГ 3; ТR 23; Р 3, 7 в течение 5 недель, при этом в каждую биологически активную точку вводят только один указанный лекарственный препарат и каждый препарат вводят в 3...5 точек.

П. формулы: 1