

Metodă de tratament al enurezisului nevrotic la copii care constă în aceea că pacientului i se administrează *per os* preparatele *Berberis-Homaccord* și *Sabal-Homaccord* timp de 3 luni de 3 ori pe zi câte 3...7 picături, *Reneel* timp de 1...2 luni câte 1 pastilă de 3 ori pe zi, *Nervoheel* timp de 2...3 luni câte 1 pastilă de 3 ori pe zi și subcutanat *Cerebrum Compositum N* de 2 ori pe săptămână câte 1,1...2,2 ml, *Tonico-Injeel* câte 0,7...1,1 ml, *Solidago Compositum S* și *Traumeel S* câte 1,1...2,2 ml o dată pe săptămână în decurs de 5...10 săptămâni în regiunea punctelor biologice active E 36; IG 3; G 14; C 5; VB 39; TR 5, 10; P10; V21, 22, 28, 31, 40, 62; R2, 7; F2, 3, 8; VC3, 4, 6; VG 2, 4, totodată în fiecare punct biologic activ se administrează un singur preparat medicamentos din cele menționate, fiecare preparat se administrează în 3...5 puncte, se efectuează masaj general relaxant, se limitează folosirea lichidelor după ora 18.00-19.00, se trezește copilul până la orele 1.00-2.00 pentru micțiune, se folosesc semnale sonore pentru formarea reflexului condiționat la micțiune, se respectă dieta cu excluderea gustărilor sărate seara, seria de tratament se repetă de 2...3 ori peste 2...4 luni.