

Изобретение относится к медицине, а именно к неврологии, педиатрии и предназначено для лечения невротического энуреза у детей.

Метод, согласно изобретению, заключается в том, что пациенту вводят *per os* *Берберис-Гомаккорд* и *Сабаль-Гомаккорд* в течение 3 месяцев 3 раза в день по 3...7 капель, *Ренель* в течение 1...2 месяцев по 1 таблетке 3 раза в день, *Нервохель* в течение 2...3 месяцев по 1 таблетке 3 раза в день и подкожно *Церебрум композитум Н* 2 раза в неделю по 1,1... 2,2 мл, *Тонико-Инъель* по 0,7...1,1 мл, *Солидаго композитум С* и *Траумель С* по 1,1... 2,2 мл 1 раз в неделю в течение 5...10 недель в область биологически активных точек Е 36; IG 3; G 14; С 5; VB 39; TR 5, 10; Р 10; V 21, 22, 28, 31, 40, 62; R 2, 7; F 2, 3, 8; VC 3, 4, 6; VG 2, 4, при этом в каждую биологически активную точку вводят только один указанный лекарственный препарат и каждый препарат вводят в 3...5 точек. Выполняют общий релаксирующий массаж, ограничивают приём жидкости после 18.00-19.00 часов, будят ребёнка до 1.00-2.00 часов ночи для мочеиспускания, используют звуковые сигналы для формирования условного рефлекса при мочеиспускании, соблюдают бессолевую диету. Лечение повторяют 2...3 раза через 2...4 месяца.

П. формулы: 1