

Изобретение относится к медицине, в частности к проктологии и может быть использовано для лечения острого язвенного неспецифического колита.

Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что применяют 5-аминосалициловую кислоту в капсулах по 1200...4000 мг в день, *per os*, в течение месяца, р-р 2-(2-метил-5-нитро1Н-имидазол-1-ил)этанол по 500 мг, внутривенно, 2 раза в день и р-р 1-циклопропил-6-флуоро-4-оксо-7-(пиперазин-1-ил)-квинолин-3-карбоксилую кислоту по 1,0 мл, внутривенно, 2 раза в день и р-р 5-(аминосульфони)N-[(1-этилпирролидин-2-ил)метил]-2-метоксибензамид по 2,0 мл вечером, в течение 7 дней, осуществляют дезинтоксикационную терапию, переливание эритроцитарной массы, плазмы, альбумина, при этом вводят 5-аминосалициловую кислоту в виде микроклизмы, через день, в течение месяца. В случае поражения ректосигмоидальной области, 5-аминосалициловую кислоту вводят в виде геля по 500 мг, один раз в день, а в случае поражения толстой кишки, 5-аминосалициловую кислоту вводят в виде пены по 2 г, 2 раза в день.

П. формулы: 3