

1. Sirop pe bază de suc de struguri, care conține extract din frunze roșii de viță de vie, acid sorbinic și sirop de 60...65% din suc de struguri și sirop de zahăr invertit, în următorul raport al componentelor, la 1 L:

extract din frunze roșii de viță de vie, g 20,0...300,0

acid sorbinic, g 0,5...0,6

sirop de 60...65% din suc de struguri
și sirop de zahăr invertit, ml restul.

2. Sirop pe bază de suc de struguri, care conține extract din lăstari de viță de vie, acid sorbinic și sirop de 60...65% din suc de struguri și sirop de zahăr invertit, în următorul raport al componentelor, la 1 L:

extract din lăstari de viță de vie, g 30,0...200,0

acid sorbinic, g 0,5...0,6

sirop de 60...65% din suc de struguri
și sirop de zahăr invertit, ml restul.

3. Sirop pe bază de suc de struguri, care conține extract din semințe de struguri, acid sorbinic și sirop de 60...65% din suc de struguri și sirop de zahăr invertit, în următorul raport al componentelor, la 1 L:

extract din semințe de struguri, g 30,0...200,0

acid sorbinic, g 0,5...0,6

sirop de 60...65% din suc de struguri
și sirop de zahăr invertit, ml restul.

4. Sirop pe bază de suc de struguri, care conține extract din lăstari de viță de vie, extract din semințe de struguri, acid sorbinic și sirop de 60...65% din suc de struguri și sirop de zahăr invertit, în următorul raport al componentelor, la 1 L:

extract din lăstari de viță de vie, g 30,0...100,0

extract din semințe de struguri, g 30,0...100,0

acid sorbinic, g 0,5...0,6

sirop de 60...65% din suc de struguri
și sirop de zahăr invertit, ml restul.